Huil. 3.

Lu par Petit

N°. 1

SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE C. N 7

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. N

le 29e Juin 1723. mr. Engerand ancien chirurgien Juré de cette ville et accoucheur. fut mandé à trois heures du matin par antoinette fournier femme de Monguilmin âgée de 22. ans. elle étoit grosse de neuf mois de son troisieme Enfant.

depuis le 28. à huit heures du soir elle avoit une perte de sang par la vulve, accompagnée des douleurs de l'enfantement; la perte ayant un peu Cessé mr. Engerand la toucha pour Examiner qu'elles étoient les dispositions à l'accouchement. il n'en trouva aucune quoy que la dilatation de l'orifice Externe luy permit de porter le doigt dans le col de la matrice jusques près de l'orifice interne où il sentit q'un corps charnu Lisse, et polit ~~le remplit~~ qui remplissoit Cet orifice ~~et~~ l'empechoit ~~son doigt~~ de passer plus loin. ce corp ne répondoit point au doigt comme sont

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 27 d, 2

Les Eaux Lors qu'elles s'assemblent En ce lieu dans le prelude de L'accouchement ordinaire, aprés avoir attendu les mouvemens de La nature, et Reconnu qu'au bout d'une heure il n'y avoit pas plus de disposition à l'accouchement, que la perte étoit cessée, que les douleurs diminuoit, et ~~que~~ sentant toujours remüer ~~son~~ l'Enfant, il Laissa réposer la malade Jusque sur les quatre heure du matin, qu'il L'examina de nouveau, et trouva les choses dans le même état, Les apparences d'accoucher n'étant pas plus favorables que lors qu'il L'avoit quitée.

Sur les huit heures du soir on vint L'appeler parce que la perte de sang étoit revenüe; il ne la trouva pas si Considerable qu'elle l'avoit été La

veille, les dispositions d'ailleurs ètoient les

mêmes

Le 30. à 9. heures du matin mr puzos aussy

~~maitre~~ chirurgien juré et celèbre accoucheur fut

mandé, et trouvant les mêmes choses; dit

que tant qu'elles ne changeroient point il

s'etoit impossible ~~de~~ d'accoucher la malade; que si

ces forces revenoient il falloit la saigner

ce qui fut fait à midy. La nuit se passa

sans douleur et sans perte considerable.

Le 1er Juillet la journée ~~fut~~ passable

~~bien~~, elle mengea un peu avec appetit, les parties

n'avoient point pretté et rien ne se disposoit à

l'accouchement. mais à huit heures du soir on

alla chercher mr Engerand qui trouva la

malade dans une perte de sang ~~fr~~ abondante qu'elle

redura que trois heures et ne cessa qu'avec la vie
son cadavre fut ouvert par mr. Engeran en presence de mr. dorlet
son confrere à L'ouverture de La matrice et des menbranes

Les Eaux s'ecoulerent en abondance; elles ~~étoient~~ avoient
~~La~~ couleur et Lodeur naturelle. L'enfant avoit
les pieds en haut et la tête en bas, de maniere,
cependant, que la tête, le col, et les Epaules
étoient plus sur le cotté gauche de La matrice,
et que le reste du corp et les pieds estoient plus panchez
sur le cotté droit, la face étoit un peu
tournée du cotté gauche.

Ce quils ~~[illegible]~~ trouverent d'extraordinaire, et qui
Est la cause de La ~~perte~~ mort de la mere et de
L'Enfant, c'est que le placenta, aulieu
d'etre attaché au fond de La matrice
comme il doit L'etre dans L'etat naturel
s'attachoit dans toute la partie inferieure

étoit Aderant au bort de L'orifice interne
de La matrice et la bouchoit Exactement
Les pieds de L'Enfant poussoient les membranes
Contre le fond de La matrice. et ~~Le col~~ La teste
et les espaulles poussoient Le placinta Contre Le col dela matrice

La tête étoit flechie Loccipit, le derriere
du col, et les Epaules appuyoient sur le
placenta de maniere que l'orifice
interne ne pouvoit ce dilater pour la
sortie de L'Enfant. ~~ainsy~~ ~~celuy~~ ~~si~~ ~~Le placenta~~
cequi a causé La mort de l'un et de lautre
~~Empechant L'orifice interne de La matrice~~
~~de ce dilater, et par consequan s'oposant~~
~~à la sortie de l'enfant la mort de~~
~~l'un, et de Lautre à dû s'en ensuivre.~~

N'ayant trouvé dans La matrice aucune
Rupture ny vestige d'hemoragie, ils en ouvrirent
Le col depuis L'orifice Externe jusqu'à
L'adherance du placenta a l'orifice interne

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

et la ils trouverent que le placenta s'etoit un peu d'etaché de son adherance avec la partie gauche de L'orifice interne, et c'est de ce lieu que venoit la perte ils y trouverent encore un caillot de sang, ce déchirement ou separation du placenta venoit sans doutte des efforts que l'enfant avoit fait inutilement pour sortir.

ils Essayerent de separer le placenta et le trouverent d'une adherance plus forte quil n'ait naturelement resitant, et fesant Bruit en ce separent; le placenta etoit si considerable quil etoit adherant a plus d'un tiers de La surface interne de la matrice son centre répondoit exterieurement vis a vis L'orifice interne, et interieurement vis a vis ce même orifice il donnoit naissance au cordon

il faut remarquer que toutes les fois que la perte revenoit on trouvoit le pouls de la malade fort élevé, et comme ces retours ont toujours été à la même heure, il y à lieu de croire que la malade avoit vne fievre double tierce qui rendoit la perte de sang periodique.

Cette observation Est telle que je l'ay pu reccüillir verbalement de messieurs Engerant puzos, et dorlet mes Confreres qui sont personnes Eclairées et sinceres

Lu par M. Petit le Chirurgien le 7 Juil. 1723.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE